



POLIPECTOMIA

Polipectomia é um procedimento terapêutico muito comum realizado durante a Colonoscopia, consistindo na remoção de lesões – os pólipos – que se podem encontrar no interior do recto e do cólon. Após a sua remoção o (s) pólipo (s) serão enviados para análise que poderá demorar cerca de 15 dias.

IMPORTANTE

- No caso da remoção de pólipos grandes deverá durante 7 dias evitar bebidas alcoólicas bem como comidas com temperos á base de picantes;
- Deverá ainda evitar esforços físicos intensos (caminhadas longas, ginásio, corrida);
- Também deverá evitar a toma de medicamentos anti-inflamatórios, antiagregantes e hipocoagulantes (Brufen, Voltarem, Aspirina, Tromalyt, Varfine, Sintron, Pradaxa, Xarelto) conforme indicação dada no dia do exame pelo Médico / Enfermeiro;
- Em caso de dor, poderá tomar Paracetamol / Ben-u ron.

RISCOS

- O risco de complicações importantes associadas à Polipectomia, como a hemorragia (1/100) e a perfuração (1/1000) é baixo. No entanto, deverá estar atento a sinais de alerta como dor de barriga forte que não alivia com medicação nem outras medidas, vômitos de sangue, perda de grande quantidade de sangue junto com as fezes bem como alteração da coloração das fezes para preta (borra de café);
- Na presença destes sintomas deverá contactar o Centro Diagnóstico João Carvalho (253 801 010) para, se possível falar com um médico do Serviço de Gastreenterologia. Caso contrário deverá dirigir-se ao serviço de Urgência do seu Hospital de referência fazendo acompanhar-se do relatório do exame que fez aquando da remoção do(s) pólipo(s).

Declaro que tomei conhecimento, e que aceito realizar o exame mediante as condições acima descritas,

Data

Assinatura conforme bilhete de identidade